

Одонтотогенная гнилостно-некротическая флегмона от 3.8. Клинический случай.

Клиническая картина при поступлении в стационар

Больная М., 30 лет, поступила в отделение ЧЛХ СОКБ с жалобами на «припухлость» и боль мягких тканей левой половины лица, ограничение открывания рта. Больна вторые сутки. Начало заболевания связывает с болями в зубе 3.8.

Вскрыты и дренированы следующие пространства:
-Поднижнечелюстное;
-Крыловидно-нижнечелюстное;
-Подмассетериальное;
-Щечное.



Внешний вид больной до операции



Внешний вид больной после операции:
«Вскрытие и дренирование флегмоны»

Процесс очищения и гранулирования раны



4-е сутки. Отторжение некротизированных тканей: кожи, подкожно-жировой клетчатки



7-е сутки



14-е сутки. Гранулирующая рана с краевой эпителизацией

Закрытие дефекта методом пластики местными тканями прямоугольными сходящимися лоскутами по Ю.К.Шимановскому



Вид раны после отпрепарированных кожно-жировых лоскутов



Вид раны после наложения внутренних кетгутовых швов



Вид раны после ушивания

Послеоперационный период



2-е сутки после пластики



7-е сутки после пластики



14-е сутки после пластики.
Эпителизация раны