




ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С КОНТРОЛИРУЕМОЙ И НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АГ



Айрапетов К.В. - научный руководитель.

Бочкарева Э. А. - студентка лечебного факультета, 616 группы;
Ткачук А.С. - студентка лечебного факультета, 612 группы.

Цель: оценить частоту возникновения гипертонических кризов у пациентов с регулярным и нерегулярным приемом антигипертензивной терапии.

Задачи:

1. Провести сравнительный анализ эффективности влияния антигипертензивной терапии на частоту возникновения гипертонических кризов.
2. Сравнить и оценить динамику показателей артериального давления в зависимости от регулярности приема антигипертензивных препаратов.

Материалы и методы исследовательской работы:

Пациенты были разделены на 2 группы:

Группа 1 - пациенты регулярно принимающие назначенную антигипертензивную терапию (n=30).

Группа 2 - пациенты со сниженной комплаентностью (n=30).




Пациентам обеих групп проводилось измерение артериального давления при обращении на прием к участковому терапевту для диспансеризации взрослого населения или профилактического осмотра в ОГБУЗ Поликлиника №3 г. Смоленска.




Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы Microsoft Excel 2010. Для сравнения между двумя независимыми группами использовался критерий t Стьюдента, различия считались достоверными при $p<0,05$.

Результаты

Показатели систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) у пациентов с регулярным и нерегулярным приемом антигипертензивных препаратов.



Частота возникновения гипертонических кризов в зависимости от регулярности приема антигипертензивных препаратов



► Анализ данных показал, что при регулярном приеме антигипертензивных препаратов (АГП) артериальное давление значительно меньше, чем при нерегулярном приеме АГП.

► На основании полученных результатов возникновение гипертонических кризов у пациентов с нерегулярным приемом АГП значительно чаще, чем у тех, кто принимает их регулярно.



Вывод: у пациентов с регулярным приемом АГП возникновение гипертонических кризов было достоверно реже, чем у пациентов с нерегулярным приемом АГП.