Казанский Государственный Медицинский Университет

ВПЧ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА

Авторы: студенты 6 курса Белозерцева А.А., Гараева А.А., Назирова А.А.

Научный руководитель: Профессор кафедры детской хирургии Морозов Валерий Иванович

Актуальность

ВПЧ представляет наибольшую опастность для женщин, так как способен вызывать рак шейки матки. Однако, в 2007 году экспертами Международного агентства по изучению рака (МАИР) была доказана роль ВПЧ 16 типа в возникновении рака полового члена.

Цель работы

Изучить уровень осведомленности населения республики Татарстан (РТ) как мужского, так и женского пола о профилактике заболеваний, вызываемых ВПЧ.

Материалы и методы исследования

Анализ актуальных научных статей, посвященных теме ВПЧ-инфекции среди мужского пола, проведение анкетирования среди жителей РТ, обработка полученной информации.

Критериями включения являлись:

- Возраст опрашиваемых от 9 до 50 лет
- Мужской и женский пол

Критерии исключения:

- Возраст участников опроса младше 9, старше 50 лет
- Отказ опрашиваемых от анкетирования

Результаты анкетирования







Выводы

Уровень развития медицины на сегодняшний день позволяет профилактировать многие заболевания, в том числе и заболевания, вызванные ВПЧ. После проведения анкетирования мы пришли к выводу о том, что уровень информированности населения о самом вирусе и способах его профилактики крайне низок, что сподвигло нас на создание брошюры, которая может использоваться во время групповых бесед, лекций для школьников и студентов, родителей подростков, а также распространяться в сети Интернет.

Распространенность ВПЧ среди лиц мужского пола



Типы ВПЧ

- ***ВПЧ 16 и 18*** - аногенитальная группа папилломавирусов с высоким онкологическим риском.
- ***6,11*** –низкоонкогенные штаммы вируса.

Специфическая профилактика ВПЧ

Бивалентная (ВПЧ 16,18) - «Церварикс»

Период вакционапрофилактики :

-девушки и женщины от 9 до 45 лет до первого полового контакта или после, но при отрицательном ВПЧ;

-мальчики и юноши от 10 до 18 лет.

Курс вакцинации трехкратный, по схеме 0-1-6 месяцев.

Четырехвалентная (ВПЧ 6,11,16,18)- «Гардасил»

Период вакцинопрофилактики:

- мальчики и мужчины с 9 до 26 лет
- девочки и женщины с 9 до 45 лет.

Стандартный курс вакцины трехкратный, по схеме 0-2-6.

Брошюра ,подготовленная авторами статьи, для популяризации информации о ВПЧ: